

国产开唇兰属(兰科)一新种

¹ 郎楷永 ² 萧丽萍

¹(中国科学院植物研究所 北京 100093) ²(嘉道理农场暨植物园 香港)

A new species of *Anoectochilus* Blume (Orchidaceae) from China

¹ LANG Kai-Yong

¹(Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093)

² SIU Lai-Ping (Gloria Siu)

²(Kodoorie Farm & Botanic Garden, Hong Kong)

Key words Orchidaceae; *Anoectochilus*; *A. nanlingensis* L. P. Siu et K. Y. Lang; China

关键词 兰科; 开唇兰属; 南岭齿唇兰; 中国

南岭齿唇兰 新种 图 1

***Anoectochilus nanlingensis* L. P. Siu et K. Y. Lang, sp. nov.** Fig. 1

A congeneribus differt plantis minimis tantum 7.5~8.5 cm altis, sepalis albis dorso striis 2 longitudinalibus grossis purpureis ornatis, petalis albis oblique angusteque linear-lanceolatis secus costam stria 1 grossa purpurea instructis et margine breviter et dense ciliatis, labello albo, inter 2 lobos apicale basi sinus macula 1 purpurea ornato, ungue in utroque latere costae maculis (3~) 4 purpureis instructo.

Herba terrestris, 7.5~8.5 cm alta. Rhizoma elongatum, cauliniforme, repens, nodosum, radicatum, 1~1.5 mm diam. Caulis teres, viridi-fuscus, erectus vel suberectus, glaber, 1~1.5 mm diam. Folia 3~5, erecto-patentia, ovata, carnosa, 6~8 mm longa, 4~6 mm lata, apice acuta, basi rotundata et petiolata, supra atrovirentia, subtus purpurascens; petioli 3~5 mm longi, inferne in vaginam amplexicaulem ampliati. Inflorescentia apicalis, racemosa, (1~) 2~3 (~4)-flora, 1.5~3 cm longa, infra inflorescentiam 2 bracteis vaginiformibus saepe instructa, rachidi et pedunculo villosa, bracteis erecto-patentibus, anguste ovatis, purpurascens, cymbiformibus, membranaceis, 5~7 mm longis, 2.5~3 mm latis, apice acuminatis, dorso glabris, margine villo-sis, ovaris brevioribus. Flores resupinati patentes; sepala alba, intermedium anguste ovato-oblongum, 5~6 mm longum, 2~2.5 mm latum, 1-nervium, apice obtusiusculum, margine glabrum, dorso glabrum striis 2 longitudinalibus grossis purpureis ornatum, cum petalis in galeam agglutinatum, interdum juxta apicem 1/5 liberum, lateralia obliqua, anguste oblongo-lanceolata, inaequilatera, 8~9 mm longa, 2.8~3 mm lata, 1-nervia, apice obtusiuscula, dorso glabra, inferne striis 2 longitudinalibus grossis purpureis instructa, margine glabra, basi in sacculum connata, calcar labelli amplectentia; petala alba, oblique angusteque linear-lanceolata, membranacea, 5~6 mm longa, ca. 1 mm lata, 1-nervia, inaequilatera, apice acutiuscula, dorso glabra secus costam stria 1 grossa




图1 南岭齿唇兰 1. 植株；2. 花苞片；3. 中萼片和花瓣粘合成的兜状物；4. 中萼片；5. 花瓣；6. 侧萼片；7. 唇瓣；8. 距内的胼胝体；9. 花药；10. 花粉块。(郭木森 绘)

Fig. 1 *Anoectochilus nanlingensis* L. P. Siu et K. Y. Lang 1. Habit; 2. Floral bract; 3. Galea formed by the agglutination of the middle sepal and petals; 4. Middle sepal; 5. Petals; 6. Lateral sepals; 7. Lip; 8. Glands in spur; 9. Anther; 10. Pollinaria.

purpurea ornata, margine breviter et dense ciliata; labellum album abaxiale porrectum, ambitu Y-forme, 12~13 mm longum, membranaceum, apice ampliatum, et bilobatum, lobis obovatis, 4~5 mm longis, antice 3.5~4 mm latis marginie undulatis, glabris, divaricatis, inter lobos apicales basi sinus macula 1 purpurea ornatis, medio labelli angustate unguiculatum, ungue 4.5~5 mm longo,

simplici parte longe elliptico, in utroque latere costae maculis (3~) 4 purpureis instructo, margine anteriore lacinii 5~ad 8-jugis fimbriatis inaequifusiformis ornato, margine posteriore serrulato, basi labelli paulo ampliatum, concavum, calcar sacciforme formanti; calcar deorsum patens, 2~2.5 mm longum, 1.5~2 mm latum, apice obtusum, indivisum, intus callis 2 anguste oblongis obsitum; columna crassa et brevis, 1.5 mm longa; anthera anguste lanceolata purpurea, prorsum inclinata, 3.5 mm longa, apice longe acuminata; pollinia 2 granulata, flava, anguste oblanceolata, ca. 3 mm longa, ad extremitatem glandula 1 plerumque instructa; rostellum roseum, apice bifurcatum; stigmata 2 lateralia subrotundata; ovarium minute cylindricum contortum glabrum, cum pedicello 7~8 mm longum, ca. 1 mm diam.

地生草本, 高 7.5~8.5 cm。根状茎伸长, 茎状, 匍匐, 具节, 生根, 直径 1~1.5 mm。茎圆柱形, 直立或近直立, 直径 1~1.5 mm, 绿褐色, 光滑。叶 3~5 枚, 直立伸展, 卵形, 肉质, 长 6~8 mm, 宽 4~6 mm, 先端急尖, 基部圆形, 上面深绿色, 背面淡紫色; 叶柄长 3~5 mm, 下部扩大成鞘抱茎。花序顶生, 总状, 具(1~)2~3(~4)朵花, 长 1.5~3 cm; 花序轴和花序柄被疏柔毛, 花序之下常具 2 枚鞘状苞片; 花苞片直立伸展, 狹卵形, 淡紫色, 膜质, 长 5~7 mm, 宽 2.5~3 mm, 先端渐尖, 背面无毛, 边缘具疏柔毛, 较子房短。花倒置, 张开; 萼片白色, 中萼片狭卵状长圆形, 长 5~6 mm, 宽 2~2.5 mm, 具 1 脉, 先端稍钝, 背面无毛, 边缘无毛, 具 2 条纵向、粗的紫红色条纹, 与花瓣粘合呈兜状, 有时靠近先端的 1/5 离生; 侧萼片斜狭长圆状披针形, 不等侧, 长 8~9 mm, 宽 2.8~3 mm, 具 1 脉, 先端稍钝, 背面无毛, 边缘无毛, 下部具 2 条纵向、粗的紫红色条纹, 基部合生成囊, 围抱唇瓣基部的距; 花瓣斜线状披针形, 膜质, 长 5~6 mm, 宽约 1 mm, 具 1 脉, 先端稍尖, 不等侧, 背面无毛, 边缘具短而密的缘毛, 沿中肋具 1 条粗的紫红色条纹; 唇瓣位于下方, 轮廓呈 Y 字形, 膜质, 长 12~13 mm, 前部扩大并 2 裂, 裂片倒卵形, 长 4~5 mm, 前端宽 3.5~4 mm, 边缘略波状, 无毛, 叉开, 在裂片之间基部凹缺处具 1 个紫红色斑点, 唇瓣中部收狭呈爪, 爪长 4.5~5 mm, 其不分裂的部分长椭圆形, 沿中肋两侧各具(3~)4 个紫红色斑点, 前部边缘具 5~8 对不等长的流苏, 而后部边缘具细齿, 唇瓣基部稍膨大, 凹陷成囊状距, 距向下伸展, 长 2~2.5 mm, 宽 1.5~2 mm, 末端钝、不裂, 内面具 2 个狭长圆形的胼胝体; 蕊柱粗短, 长 1.5 mm; 花药狭披针形, 紫红色, 向前倾斜, 长 3.5 mm, 先端长渐尖; 花粉团 2 个, 粒粉质, 黄色, 狹倒披针形, 长约 3 mm, 末端共同具 1 个小的粘盘; 蕊喙粉红色, 先端叉状; 柱头 2 个, 侧生, 近圆形; 子房细圆柱形, 扭转, 无毛, 连同花梗长 7~8 mm, 直径 1 mm。

China. Guangdong (广东): Nanling National Nature Reserve (南岭国家级保护区), Tianjing Mt. (天井山), in forests, alt. 1560 m, 2000-06-30, L. P. Siu (萧丽萍) Gs-16-2000 (holotype, here designated, PE).

本种与属中其他种的区别在于其植株很小, 高仅 7.5~8.5 cm, 萼片白色, 背面具 2 条纵向、粗的紫红色条纹, 花瓣白色, 斜线状披针形, 沿中肋具 1 条粗的紫红色条纹和边缘具短而密的缘毛, 唇瓣白色, 顶部 2 裂片基部凹缺处具 1 个紫红色斑点, 爪部在中肋两侧各具(3~)4 个紫红色斑点。